

Comment se protéger de la variole du singe?

la prévention se fait respectant ses instructions clés :

Le lavage des mains avec de l'eau propre et du savon ou l'usage du désinfectant ;

Éviter de toucher : le malade infecté par le virus, le corps de celui qui est mort infecté par le virus, l'animal contaminé, l'animal mort par la variole du singe ou une surface touchée par une personne infectée ;

Éviter de consommer la viande de l'animal infecté ou mort sans raison connue ;

Éviter de vivre avec les animaux dans une même pièce ;

. Pour ceux qui étaient atteints du virus, éviter les rapports sexuels pendant une durée de trois mois après le traitement

Éviter le vagabondage sexuel

Existe-t-il un vaccin contre la variole du singe ?

Oui, le vaccin existe mais pas encore au Burundi.

Une personne infectée par la variole du singe peut-elle guérir?

Oui, elle le peut si elle se fait traitée à l'hôpital et qu'elle suit bien les indications du médecin.

Qui sont les plus vulnérables?

Chaque personne est susceptible de contracter le virus. Mais les plus vulnérables sont les enfants, les femmes enceintes et d'autres personnes ayant un système immunitaire faible ou atteints par d'autres maladies virales ou non.



MINISTÈRE DE LA SANTÉ PUBLIQUE ET DE LA
LUTTE CONTRE LE SIDA

MPOX

L'épidémie de la variole du singe

C'est quoi la variole du singe ?

La variole du singe appelé «MPOX» en anglais est une maladie virale très contagieuse provenant du singe.

La maladie est surtout caractérisée par des boutons contenant du plasma.

La maladie, est-elle présente au Burundi?

Oui, il y a des cas déjà testés positifs.

En date du 25 juillet 2024, le Ministère de la Santé Publique et de la Lutte contre le Sida a annoncé solennellement la manifestation des premiers cas, dans le pays.



GLOBAL DEVELOPMENT
COMMUNITY BURUNDI



pour chaque enfant

Les symptômes et Symptômes



Les boutons sur le corps



Les gâglions



Les maux de tête



La toux



La forte fièvre



Les douleurs musculaires



Les douleurs du dos



La fatigue généralisée

Quand est-ce que les symptômes de la variole du singe apparaissent?

Les symptômes apparaissent après 5 à 21 jours depuis la contamination du virus. Les symptômes peuvent disparaître après 2 à 4 semaines si le malade est traité dans les plus brefs délais, à l'hôpital.

Quelles sont les moyens de contamination de la variole du singe ?



Se saluer en se serrant les mains



En touchant les surfaces contaminées



En partageant le lit ou les vêtements avec la personne infectée



Par des rapports sexuels



De la mère à l'enfant pendant la grossesse et l'accouchement



Par contact direct avec une personne infectée



Par des gouttelettes



En utilisant les objets contaminés



Par contact direct avec des animaux trouvés morts ou consommant leur viande

La personne contaminée peut-elle être très souffrante à cause de la variole du singe?

Si la personne affectée ne se fait pas traiter à l'hôpital dans les plus brefs délais, elle peut tomber gravement malade voire même y laisser la vie.

